

L'ONCOLOGIA PROSTATICA, UNA PARTITA IMPORTANTE CHE SI VINCE CON IL GIOCO DI SQUADRA

Screening del cr prostatico nel paziente con familiarità negativa

- Intervallo delle visite di screening e del dosaggio del Psa totale: distanza tra linee guida e



pratica clinica

- Psa free e ratio: è arrivato il momento della pensione?



- Cut off del Psa totale: ha un senso parlarne ancora? Come cambia la lettura del Psa totale

sulla base dell'età e del volume prostatico.

- DRE quale fattore indipendente nell'indicazione ad una biopsia prostatica

✓ Attuali linee guida

✓ DRE borderline (lieve aumento di consistenza o minuscola area nodulare) in paziente con

Psa stabile nel regime di normalità ed RMN negativa : indicazione alla biopsia sistematica


Screening del cr prostatico nel paziente con familiarità positiva

- Rischi per il paziente con familiarità positiva in termini di probabilità di insorgenza della malattia, tempi di insorgenza e prognosi

- Quando iniziare lo screening, intervallo delle visite di screening e del dosaggio del Psa

totale

- Cut off e lettura del Psa totale: come cambia nel paziente con familiarità positiva?
- Come cambia l'interpretazione di aree Pirads 3 alla RMN
- E se il paziente fosse BRCA positivo cosa cambierebbe rispetto alla sola familiarità positiva ?
- Indicazioni attuali all'esecuzione dei test genetici BRCA

 - Paziente con familiarità positiva per cr mammario e ovarico ma negativa per cr prostatico:

come cambia lo screening

XV CONGRESSO
IL CANCRO DELLA PROSTATA NEL PAZIENTE OVER 80

- Eventuale eleggibilità di selezionati pazienti over 80 al trattamento radioterapico
- Iter diagnostico nel paziente non candidato a trattamento primario

18-19-20 SETTEMBRE
 THE NICOLAUS HOTEL
 BARI

- Cut off del Psa totale per eventuale indicazione a terapia medica
- Diagnosi clinica di cr prostatico basata su Psa elevato e DRE positivo:

è sufficiente per giustificare un'eventuale terapia medica palliativa?

- ✓ Se e quando richiedere una RMN multiparametrica
- ✓ Se e quando richiedere una biopsia prostatica
- ✓ E in caso di Psa elevato e DRE non sospetto?

- Esami di stadiazione: quando eseguirli (prima o dopo l'inizio della terapia) e quali eseguire

- Terapia medica palliativa consigliata

RECIDIVA BIOCHIMICA DI CR PROSTATICO POST-CHIRURGIA

- Attuale cut off del Psa che definisce una recidiva biochimica
- Stadiazione: come eseguirla e quando
- Tempi e indicazioni all'eventuale trattamento radioterapico
- Criteri di associazione dell'ormonoterapia alla radioterapia

TRATTAMENTO DEL PAZIENTE OLIGOMETASTATICO

- Attuali indicazioni al trattamento primario
- Terapia medica gold standard
- Stadiazione del paziente in corso di terapia
- Update sulle indicazioni all'utilizzo degli ARTA e attuale prescrivibilità
 - Paziente M0 CRPC
 - Paziente M+ ormonosensibile
 - Paziente M+ CRPC



Società Italiana
Urologia Territoriale

XV

CONGRESSO
NAZIONALE

SIUT

18-19-20 SETTEMBRE

THE NICOLAUS HOTEL

BARI

2025